


¿TIENE PREGUNTAS? PREGUNTE A SU MÉDICO ACERCA DE FRUZAQLA



Es importante que hable con su médico sobre qué esperar con el tratamiento. Utilice esta guía para ayudarlo a iniciar la conversación*

*Esta herramienta no está diseñada para proporcionar asesoramiento médico.

 **Fruzaqla**[®]
(fruquintinib) capsules
5 mg • 1 mg

¿Qué es FRUZAQLA[®] (fruquintinib)?

FRUZAQLA es un medicamento recetado utilizado para tratar a adultos con cáncer de colon o recto que se ha extendido a otras partes del cuerpo (cáncer colorrectal metastásico [CCRM]) y que han recibido tratamiento previo con ciertos medicamentos contra el cáncer.

No se sabe si FRUZAQLA es seguro y eficaz en niños.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento, la Información importante de seguridad completa en las páginas 6-9 y la Información para el paciente en la Información [de prescripción completa](#) de FRUZAQLA que se acompaña.

PREGUNTAS DE DEBATE



¿Por qué estoy tomando FRUZAQLA?



¿En qué se diferencia FRUZAQLA de la quimioterapia?



¿Cómo debo tomar FRUZAQLA?



¿Con qué frecuencia tendré que visitar a mi médico mientras tomo FRUZAQLA?

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

FRUZAQLA puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Presión arterial alta (hipertensión).** La presión arterial alta es frecuente con FRUZAQLA y también puede ser grave. Su proveedor de atención médica comprobará su presión arterial antes de iniciar el tratamiento con FRUZAQLA, una vez a la semana durante el primer mes de tratamiento y, a continuación, al menos una vez al mes o con una frecuencia mayor si es necesario durante el tratamiento. Su proveedor de atención médica puede recetarle medicamentos para tratar su presión arterial alta si es necesario. Informe a su proveedor de atención médica si experimenta alguno de los siguientes síntomas de hipertensión durante el tratamiento: dolor de cabeza intenso, aturdimiento o mareo, confusión, cambios en la visión, dolor en el pecho, dificultad para respirar, hemorragias nasales o vómitos.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento, la Información importante de seguridad completa en las páginas 6-9 y la Información para el paciente en la Información [de prescripción completa](#) de FRUZAQLA que se acompaña.



¿Cuáles son algunos de los posibles efectos secundarios de FRUZAQLA y qué debo hacer si experimento alguno?



¿Qué pasa si me salteo una dosis?



¿Cómo afectará FRUZAQLA a mi vida diaria?

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

- **Sangrado grave (hemorragia).** FRUZAQLA puede provocar sangrado que puede ser grave y causar la muerte. Informe a su proveedor de atención médica si presenta alguno de los siguientes síntomas de sangrado durante el tratamiento:
 - hemorragia inusual, grave o que no se detiene
 - moretones
 - aturdimiento
 - vómitos con sangre o vómitos con aspecto de granos de café
 - sangre en las heces o heces negras con aspecto de alquitrán
 - sangre en la orina u orina que parece roja, rosa o marrón
 - tos con sangre o coágulos de sangre
 - sangrado menstrual más abundante de lo normal
 - sangrado vaginal inusual
 - sangrado nasal frecuente

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento, la Información importante de seguridad completa en las páginas 6-9 y la Información para el paciente en la Información [de prescripción completa](#) de FRUZAQLA que se acompaña.



Fruzaqla[®]
(fruquintinib) capsules
5 mg • 1 mg



Su médico puede cambiarle la dosis de FRUZAQLA si es necesario

Tome FRUZAQLA exactamente como le indique su médico.
Asegúrese de hablar con su médico o farmacéutico si tiene alguna pregunta sobre FRUZAQLA o su dosis.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento, la Información importante de seguridad completa en las páginas 6-9 y la Información para el paciente en la Información de prescripción completa de FRUZAQLA que se acompaña.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Qué es FRUZAQLA® (fruquintinib)?

FRUZAQLA es un medicamento recetado utilizado para tratar a adultos con cáncer de colon o recto que se ha extendido a otras partes del cuerpo (cáncer colorrectal metastásico [CCRm]) y que han recibido tratamiento previo con ciertos medicamentos contra el cáncer.

No se sabe si FRUZAQLA es seguro y eficaz en niños.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

FRUZAQLA puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:


- **Presión arterial alta (hipertensión).** La presión arterial alta es frecuente con FRUZAQLA y también puede ser grave. Su proveedor de atención médica comprobará su presión arterial antes de iniciar el tratamiento con FRUZAQLA, una vez a la semana durante el primer mes de tratamiento y, a continuación, al menos una vez al mes o con una frecuencia mayor si es necesario durante el tratamiento. Su proveedor de atención médica puede recetarle medicamentos para tratar su presión arterial alta si es necesario. Informe a su proveedor de atención médica si experimenta alguno de los siguientes síntomas de hipertensión durante el tratamiento: dolor de cabeza intenso, aturdimiento o mareo, confusión, cambios en la visión, dolor en el pecho, dificultad para respirar, hemorragias nasales o vómitos.
- **Sangrado grave (hemorragia).** FRUZAQLA puede provocar sangrado que puede ser grave y causar la muerte. Informe a su proveedor de atención médica si presenta alguno de los siguientes síntomas de sangrado durante el tratamiento:
 - hemorragia inusual, grave o que no se detiene
 - moretones
 - aturdimiento
 - vómitos con sangre o vómitos con aspecto de granos de café
 - sangre en las heces o heces negras con aspecto de alquitrán
 - sangre en la orina u orina que parece roja, rosa o marrón
 - tos con sangre o coágulos de sangre
 - sangrado menstrual más abundante de lo normal
 - sangrado vaginal inusual
 - sangrado nasal frecuente
- **Infecciones.** FRUZAQLA puede aumentar el riesgo de infecciones, incluidas infecciones graves que pueden provocar la muerte. Las infecciones más frecuentes con FRUZAQLA se produjeron en las vías urinarias, la nariz o la garganta y los pulmones. Informe a su proveedor de atención médica si experimenta alguno de los siguientes síntomas de infección durante el tratamiento: fiebre, tos intensa con o sin aumento de la producción de mucosidad (esputo), dolor de garganta intenso, dificultad para respirar, sensación de ardor o dolor al orinar, o enrojecimiento, hinchazón o dolor en cualquier parte del cuerpo.

Consulte la Información importante de seguridad que continúa en la página siguiente y la Información para el paciente en la Información [de prescripción completa](#) que se acompaña.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

- **Un desgarro en el estómago o en la pared intestinal (perforación gastrointestinal).** FRUZAQLA puede causar perforación gastrointestinal que puede ser grave y provocar la muerte. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si experimenta alguno de los siguientes síntomas de perforación gastrointestinal durante el tratamiento: dolor de estómago (abdominal) intenso o dolor de estómago que no desaparece, vómitos o vómitos con sangre, sangre en las heces o heces negras que se parece al alquitrán, fiebre o escalofríos, o náuseas.
- **Problemas hepáticos.** El aumento de las enzimas hepáticas en sangre es frecuente con FRUZAQLA y también puede ser grave y provocar la muerte. Su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre antes y durante el tratamiento con FRUZAQLA para controlar si hay problemas hepáticos. Informe a su proveedor de atención médica si experimenta alguno de los siguientes síntomas de problemas hepáticos durante el tratamiento: color amarillento en la piel o en la parte blanca de los ojos, orina de color oscuro (color del té), dolor en la zona superior derecha del estómago (abdomen), pérdida del apetito, náuseas o vómitos, o sangrado o moretones.
- **Proteínas en la orina (proteinuria).** Las proteínas en la orina son frecuentes con FRUZAQLA y también puede ser grave. Su proveedor de atención médica controlará su orina para detectar proteínas antes de iniciar y durante el tratamiento con FRUZAQLA. Informe a su proveedor de atención médica si tiene que orinar más de lo habitual o si tiene hinchazón de cara, manos, brazos, piernas o pies durante el tratamiento.
- **Reacciones cutáneas en las manos o en los pies (eritrodisestesia palmo-plantar [EPP]).** Las reacciones cutáneas en las manos o en los pies son frecuentes con FRUZAQLA y también pueden ser graves. Informe a su proveedor de atención médica si tiene una erupción cutánea grave o enrojecimiento, dolor, ampollas, sangrado o hinchazón en las palmas de las manos o las plantas de los pies durante el tratamiento.
- **Síndrome de encefalopatía posterior reversible (SEPR).** La SERP es una afección grave que puede producirse en su cerebro durante el tratamiento con FRUZAQLA. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas durante el tratamiento: dolor de cabeza, convulsiones, confusión, cambios en la visión o problemas para pensar.
- **Problemas de cicatrización de heridas.** Las heridas pueden no curarse adecuadamente durante el tratamiento con FRUZAQLA. Informe a su proveedor de atención médica si prevé someterse a alguna cirugía antes o durante el tratamiento con FRUZAQLA. Debe dejar de tomar FRUZAQLA al menos 2 semanas antes de la cirugía programada. Su proveedor de atención médica le comunicará cuándo puede empezar a tomar FRUZAQLA de nuevo después de la cirugía.

Consulte la Información importante de seguridad que continúa en la página siguiente y la Información para el paciente en la Información [de prescripción completa](#) que se acompaña.

 **Fruzaqla**[®]
(fruquintinib) capsules
5 mg • 1 mg

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

• **Coágulos de sangre en los vasos sanguíneos (arterias).** FRUZAQLA puede provocar coágulos de sangre o el bloqueo de los vasos sanguíneos lo que puede provocar ataque cardíaco, accidente cerebrovascular o la muerte. Busque atención médica de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas durante el tratamiento:

- dolor o presión intensos en el pecho
- dolor en los brazos, las piernas, la espalda, el cuello o la mandíbula
- dificultad para respirar
- entumecimiento o debilidad de la cara, brazo o pierna, especialmente en un lado del cuerpo
- sensación de aturdimiento o desmayo
- sudoración en más cantidad de lo habitual
- confusión repentina, dificultad para hablar o comprender cosas
- problemas para caminar
- dolor de cabeza repentino e intenso
- cambios repentinos en la visión de uno o ambos ojos
- mareos o pérdida del equilibrio o la coordinación

• **Reacciones alérgicas a FD&C amarilla n.º 5 y FD&C amarilla n.º 6.** Las cápsulas de FRUZAQLA 1 mg contienen los ingredientes inactivos FD&C amarilla n.º 5 (tartrazina) y FD&C amarilla n.º 6 (amarillo ocaso FCF). La FD&C amarilla n.º 5 (tartrazina) puede provocar reacciones de tipo alérgico (incluido el asma bronquial) en ciertas personas, especialmente en personas que también tienen alergia a la aspirina. La FD&C amarilla n.º 6 (amarillo ocaso FCF) también puede provocar reacciones alérgicas. Informe a su proveedor de atención médica si experimenta urticaria, erupción cutánea o dificultad para respirar durante el tratamiento con FRUZAQLA.

Los efectos secundarios más comunes de FRUZAQLA incluyen:


- cambios en la voz o ronquera
- dolor en el área del estómago (abdominal)
- diarrea
- debilidad, falta de fuerzas y energía, y sensación de mucho cansancio o somnolencia (astenia)

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de FRUZAQLA. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. **Puede informar los efectos secundarios a Takeda al 1-844-662-8532 o con la FDA a 1-800-FDA-1088 o www.fda.gov/medwatch.**

Antes de tomar FRUZAQLA, informe a su proveedor de atención médica acerca de todas sus afecciones médicas, incluido si:

- Tiene presión arterial alta
- Tiene problemas de sangrado
- Tiene una infección
- Tiene problemas hepáticos o renales

Consulte la Información importante de seguridad que continúa en la página siguiente y la Información para el paciente en la Información [de prescripción completa](#) que se acompaña.

 **Fruzaqla**[®]
(fruquintinib) capsules
5 mg • 1 mg

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

- Planea someterse a algún procedimiento quirúrgico o se ha sometido a una cirugía recientemente. Debe dejar de tomar FRUZAQLA al menos 2 semanas antes de su cirugía programada. Su proveedor de atención médica le dirá cuándo puede comenzar de nuevo con FRUZAQLA después de la cirugía
- Haber tenido recientemente un coágulo de sangre, un accidente cerebrovascular o un ataque cardíaco
- Es alérgico a FD&C amarilla n.º 5 (tartrazina) o a FD&C amarilla n.º 6 (amarillo ocazo FCF)
- Está embarazada o planea quedar embarazada. FRUZAQLA puede dañar al bebé en gestación. No debe quedar embarazada durante el tratamiento con FRUZAQLA.

Mujeres que pueden quedar embarazadas:

- Su proveedor de atención médica le hará una prueba para la detección del embarazo antes de que comience el tratamiento con FRUZAQLA.
- Use un método anticonceptivo eficaz (contracepción) durante el tratamiento y durante 2 semanas después de la última dosis de FRUZAQLA.
- Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si queda embarazada durante el tratamiento con FRUZAQLA.

Hombres con parejas de sexo femenino que pueden quedar embarazadas:


- Use un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y durante 2 semanas después de la última dosis de FRUZAQLA.
- Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si su pareja queda embarazada durante su tratamiento con FRUZAQLA.
- Está amamantando o planea hacerlo. Se desconoce si FRUZAQLA pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento y durante 2 semanas después de la última dosis de FRUZAQLA.

Informe a su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y los de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. FRUZAQLA podría afectar la forma en que actúan otros medicamentos y otros medicamentos pueden afectar la forma en que actúa FRUZAQLA.

En especial, informe a su proveedor de atención médica si toma diluyentes de la sangre (anticoagulantes).

Conozca los medicamentos que usa. Conserve una lista de sus medicamentos para mostrársela a su proveedor de atención médica y farmacéutico cuando reciba un nuevo medicamento.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento y la Información para el paciente en la Información [de prescripción completa](#) de FRUZAQLA que se acompaña.

 **Fruzaqla**®
(fruquintinib) capsules
5 mg • 1 mg



Estamos aquí para ayudarlo a comprender las opciones de cobertura, la asistencia financiera disponible y los recursos educativos.

Para hablar con un administrador de casos, llame al **1-844-817-6468**, opción 2. **Hablemos. Estamos disponibles de lunes a viernes, de 8 A.M. a 8 P.M., hora del este.**

Para obtener más información sobre Takeda Oncology Here2Assist, visite www.Here2Assist.com/patient/home

Visite FRUZAQLA.com para obtener más información

¿Qué es FRUZAQLA® (fruquintinib)?


FRUZAQLA es un medicamento recetado utilizado para tratar a adultos con cáncer de colon o recto que se ha extendido a otras partes del cuerpo (cáncer colorrectal metastásico [CCRM]) y que han recibido tratamiento previo con ciertos medicamentos contra el cáncer.

No se sabe si FRUZAQLA es seguro y eficaz en niños.




INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Informe a su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y los de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. FRUZAQLA podría afectar la forma en que actúan otros medicamentos y otros medicamentos pueden afectar la forma en que actúa FRUZAQLA.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento, la Información importante de seguridad completa en las páginas 6-9 y la Información para el paciente en la Información de [prescripción completa](#) de FRUZAQLA que se acompaña.



ONCOLOGY

TAKEDA y  son marcas comerciales registradas de Takeda Pharmaceutical Company Limited. FRUZAQLA y  son marcas comerciales de HUTCHMED Group Enterprises Limited, utilizadas con licencia. HERE2ASSIST y  son marcas comerciales registradas de Millennium Pharmaceuticals, Inc. ©2024 Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. USO-FRQ-0239 10/24